

Lookup

Enter item name to lookup.

Analyze

[LORazepam](#)

[Tapentadol](#)

[Venlafaxine](#)

•Display complete list of interactions for an individual item by clicking item name.

•Add another item(s) [Lookup] to Analyze for potential interactions between items

[Customize Analysis](#)

Only interactions at or above the selected [risk rating](#)
View interaction detail by clicking on link.

LORazepam
[C] [Tapentadol](#) (CNS Depressants)

Tapentadol
[C] [LORazepam](#) (CNS Depressants)
[D] [Venlafaxine](#) (Serotonin Modulators)

Venlafaxine
[D] [Tapentadol](#) (Serotonin Modulators)

Interazione farmacologica fra Lorazepam, Tapentadolo e Venlafaxina

- A sinistra, elenco dei farmaci ASSUNTI;
 - sulla destra si vede l'entità della interazione:
 - ◆ quando il rapporto è contrassegnato con una "C", vuol dire che fra i 2 farmaci vi è una interferenza di una certa entità per cui è meglio modificare il dosaggio.
 - ◆ Quando invece vi è una "D", allora è sconsigliato prendere i 2 farmaci nello stesso tempo: si può anche fare, ma sotto stretta sorveglianza medica.
- (da www.uptodate.com)

Prima di prendere una nuova medicina:

di che cosa debbo informare il mio medico? Che cosa debbo chiedergli?

- a. **Informalo:**
 - b. se hai un'allergia già nota al farmaco appena prescritto o altre componenti del prodotto commerciale;
 - c. se sei allergico a qualsiasi altro medicinale simile a questo;
 - d. se sei allergico ad altri farmaci, o a alimenti, o altre sostanze.
- e. **Ricordagli:**
 - f. quello che eventualmente ti è successo circa i segni di allergia, come arrossamenti della pelle, orticaria, prurito, mancanza di respiro o respiro sibilante, tosse, gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola, o qualsiasi altro segno.
- g. Metti al corrente il **medico** e il **farmacista:**
 - h. di tutti i farmaci che stai prendendo,
 - i. sia prescrizioni,
 - j. sia farmaci da banco, o vitamine o prodotti naturali;
 - k. e di qualsiasi altro problema di salute.
- l. **È necessario che tu verifichi che sia sicuro** per te il prendere questo farmaco da solo o insieme a tutte le altre medicine che già assumi, considerando i tuoi eventuali problemi di salute.
- m. Non avviare, interrompere o modificare il dosaggio di qualsiasi farmaco, senza esserti consultato con il medico.

Tratto da www.uptodate.com: Come si può facilmente capire da quanto sopra tradotto si vuole che il Paziente in prima persona si renda conto della terapia che fa e si cauteli.